

Нерсинат LP

Бір таблетканы тамақтану кезінде немесе тамақтанғаннан кейін бір уақытта қабылдау ұсынылады. Бұл ретте тамақ: орташа калориялы, яғни 600 калория немесе майлығы 25-20%; жоғары калориялы — 1000 калория немесе майлығы 50% болуы мүмкін.

Бұл дәрі-дәрмекті ащ қарынға қабылдау вирусқа қарсы әсерді төмендетпейді. Хепсинат таблеткаларын ұсақтау, бөлікке бөлу немесе сумен сұйылтудың қажеті жоқ екенін білу маңызды. Күн сайын бір уақытта қабылдауға тырысыңыз. Мұндай жүйе сізге таблетка қабылдау туралы ұмытуға көмектеседі, сонымен қатар ағзадағы белсенді заттардың тұрақты құрамының арқасында неғұрлым тиімді болады.

Егер сіз Хепсинаттың қажетті дозасын қабылдауды ұмытып қалсаңыз, ешқандай жағдайда бір мезгілде екі таблетканы ішпеңіз, бұл улану және анафилактикалық шок болуы мүмкін!

Бұл препарат С гепатиті бар науқастарға бірінші және төртінші генотипке тағайындайды. Толық емдеу курсынан кейін қайталану мүмкін болу қаупі бастапқы жағдайға байланысты:

- * Ауру дәрежесі;
- * Бауыр циррозының болуы;
- * Ілеспе вирустардың болуы;
- * ЖИТС немесе АИВ инфекциясының болуы.

Вирусқа қарсы терапиядан бірінші рет өтетін науқастарға, емдеу курсы әдетте 12 аптаға тағайындайды.

Вирусқа қарсы препараттармен (рибавиринмен немесе интерферонмен) емдеу курсынан өткен науқас және ол табысты емес болса, дәрігердің қалауы бойынша Нерсинат LP қабылдауының 12 немесе 24 аптаға тағайындайды.

Бүйрек қызметінің бұзылуымен ауыратын науқастарға, сондай-ақ бүйрек жетіспеушілігіне байланысты софосбюрлердің негізгі компонентінің шоғырлануына байланысты ұсыныстар жоқ.

Дәрігердің тағайындауы бойынша қабылдау.